

LOBITO DE RIO



Foto: Anibal Pareira

Descripción: Similar a otras nutrias del mundo, tiene el cuerpo alargado, las patas cortas con los dedos unidos por membranas, la cabeza pequeña, con orejas chicas y la cola larga. En el extremo del hocico, el rinario es angosto y puede presentar una hendidura superior central. Se encuentra perfectamente adaptado a la natación. Su pelaje marrón está formado por dos tipos de pelo: uno corto y denso y otro largo y rústico. Ventralmente es claro, especialmente en la garganta. El macho es un veinte a veinticinco por ciento más voluminoso que la hembra, con la cabeza mayor y el cuello más ancho. Mide entre noventa y ciento veinte centímetros y pesa entre seis y once kilos (extraordinariamente llega a los catorce).

Biología: Vive en casi todos los ambientes acuáticos del norte argentino, preferentemente en sectores con buena cobertura vegetal. Es una especie ecológicamente versátil y puede tolerar modificaciones ambientales. Se la puede encontrar en las inmediaciones de grandes ciudades como Posadas (provincia de Misiones) y Montevideo (Uruguay). Su dieta consiste en peces, crustáceos y moluscos (eventualmente pequeños reptiles, aves y mamíferos), los que obtiene en inmersiones de treinta segundos promedio. En el río Iguazú come principalmente viejas de agua (*Loricariidae*) y chanchitas (*Cichlidae*) (3 y 5). En la laguna Iberá también preda sobre tarariras (*Hoplias malabaricus*), y en otros lugares

del espinal complementa su dieta con almejas (3). Los excrementos son depositados en sitios costeros visibles (funcionan como «balizas» indicadores de su presencia). Se desconoce su reproducción en condiciones naturales. Cuando las hembras entran en celo se produce el encuentro de parejas por unos días. La gestación dura unos sesenta días y tienen entre una y cinco crías. Estas nacen en troncos huecos, barrancas protegidas por raíces o cuevas excavadas por la hembra. Los refugios están a no más de ciento cincuenta metros de la orilla. Antes del destete, las crías ya ingieren alimentos sólidos (presas maltratadas que la madre le acerca), favoreciendo un activo proceso de aprendizaje. Paulatinamente cobran

independencia y al año se alejan y dispersan. De actividades diurnas, ante continuos disturbios en el ambiente, puede convertirse en nocturno. Aunque es solitario, mantiene activa comunicación a través de marcas y señales olfativas con otros lobitos de sectores vecinos. Las parejas sólo se ven en época de cría y raramente se observan familias. Su densidad poblacional es poco conocida pero se sabe muy variable. En laguna Iberá se estima en 1,47 a 2,76 individuos por kilómetro lineal de costa, siendo más alta que la de la mayoría de los lutrinos del mundo (6).

Distribución geográfica:

América Central y del Sur, desde México hasta la Argentina. En nuestro país habita en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y norte de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa; posiblemente en La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba.

Población: Se desconocen su números. Está presente en algunos zoológicos, como los de Buenos Aires, La Plata, Roque Sáenz Peña (Chaco), y en Mundo Marino (San Clemente, Bs. As.). Pero nunca se ha logrado reproducir con éxito en cautiverio, ya que es una situación que toleran con dificultad.

Situación: Ha sido objeto de una gran presión de caza en el país, en particular entre las décadas 1950 a 1970, lo que comprometió de forma tal su estado de conservación que la actividad se tornó poco rentable y eventual. Sus pobla-

Foto: R. Cinti



ciones parecen haberse recuperado, pero es aventurado hablar de una buena situación en general. Su dificultosa observación y la insuficiente información suelen llevar a subestimaciones en el estado de sus poblaciones.

Medidas de conservación:

En la Argentina se encuentra protegida, al menos en los parques nacionales El Rey, Baritú, Calilegua, Iguazú, Pilcomayo, Chaco, El Palmar y Mburucuyá; en la Reserva Provincial Estricta Otamendi, la Reserva Natural Formosa,

la Reserva Provincial Iberá, y en los refugios de vida silvestre El Cachapé, Bouvier, San Juan Poriahú, y otros en la provincia de Misiones. Cuenta con protección legal y figura en el Apéndice I de CITES (comercio internacional prohibido). Está considerada una especie *vulnerable* por la UICN, al igual que por la FVSA. En 1992 fue declarada Monumento Natural Provincial en Corrientes. La FVSA la considera una especie prioritaria dentro de su plan de acción, monitorea y denuncia su comercio ilegal (casi inexistente) y sugiere continuar con las investigaciones iniciadas.

**Claudio Bertoniatti
y Aníbal Parera**

Orden: Carnívora

Familia: Mustelidae

Nombre científico: *Lutra longicaudis* (Olfers, 1818)

Status: Vulnerable

Otros nombres vulgares: Nutria verdadera, lobito, lobo-pé, lobo de río Chico. En inglés: neotropical river otter.

Bibliografía

- 1-García-Mata, R. 1979. Report on *Lutra platensis* and *Lutra provocax* in Argentina. En: Otter Specialist Group Report to SSC. Meeting, Cambridge, UK.
- 2-Olimpio, J. 1992. Consideracoes preliminares sobre hábitos alimentares de *Lutra longicaudis* (OLFERS, 1818) (Carnívora: Mustelidae), na lagoa do Peri, Ilha de Santa Catarina, Anales III Reunión de Especialistas en mamíferos acuáticos de América del Sur: 36-42, Brasil.
- 3-Parera, A. 1992. Dieta de *Lutra longicaudis* en la laguna Iberá, Corrientes, Argentina. V Reunión de Esp. en mamíf. acuát. de América del Sur. Libro de resúmenes, Bs. As.
- 4-Parera, A. 1992. Disminución potencial del hábitat del Lobito de río, *Lutra longicaudis* en el área de influencia de la represa Yaciretá, Argentina y Paraguay. Idem anterior.
- 5-Parera, A. 1993. Dieta de *Lutra longicaudis* en el río Iguazú, Misiones, Argentina. XVI Reunión Argentina de Ecología. Libro de resúmenes, Puerto Madryn, Argentina.
- 6-Parera, A. 1993. Aplicación de censos directos sobre el lobito de río en la laguna Iberá. Idem anterior.